

HaloRed Kontraindikationen

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Erkrankungen, bei denen die Verwendung von HaloRed vermieden werden sollte.

- 1) Erkrankungen, die die Netzhaut des Auges betreffen, wie z. B. Diabetes
- 2) Photosensibilisierende Medikamente wie Lithium, Melatonin, Phenothiazin, Antipsychotika und bestimmte Antibiotika.
- 3) Schwangerschaft
- 4) Epilepsie
- 5) Personen, die derzeit Kortisoninjektionen oder Steroide einnehmen
- 6) Von der Anwendung der Rotlichttherapie direkt über der Schilddrüse bei bestimmten Schilddrüsenerkrankungen wird abgeraten
- 7) Aufgrund der erhöhten Durchblutungsreaktion durch Rotlicht/NIR wird davon abgeraten, die Rotlichttherapie bei aktiven Blutungen oder blutenden Wunden anzuwenden, da dies zu noch mehr Blutungen führen kann.
- 8) Halotherapie wird in folgenden Fällen nicht empfohlen: Tuberkulose, Fieber, ansteckende Krankheiten, schwere Herzerkrankungen oder Krebs, fortgeschrittene Schwangerschaft oder akute Atemwegserkrankungen.

Haftungsausschluss: Die Anwendung der Salztherapie ist nicht als Ersatz für medizinische Versorgung oder Behandlung gedacht.